

BRODITOP

BRODITOP est un appât prêt à l'emploi sous forme de pâte fraîche huileuse et aromatisée dosée à 0.005% de Brodifacoum.

ACTION

Les anticoagulants permettent de ne pas éveiller la méfiance des rongeurs (relation entre l'ingestion de l'appât et la mort de leur congénères) car les premiers signes cliniques n'apparaissent que plusieurs jours après l'ingestion de l'appât.

Délai de l'apparition de l'effet biocide : 4 à 7 jours après consommation.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

BRODITOP est proposé en sachets-doses de 10 g facilitant ainsi le dosage et la manipulation.

Déposer les appâts dans des boîtes ou postes d'appâtage pour rodenticides sécurisés et inviolables. Placer ces boîtes aux endroits fréquentés par les rongeurs (près des nids, des sites de nourriture, sur les passages et aux autres endroits où l'animal gîte).

Contrôler régulièrement les boîtes afin de vérifier la consommation. La fréquence du contrôle sera fonction de la consommation, par exemple tous les 3 à 5 jours. Lors de chaque contrôle, compléter les postes d'appâtage de la quantité consommée jusqu'à l'arrêt complet de la consommation. Les rongeurs morts doivent être retirés régulièrement. Les appâts souillés doivent être remplacés car ils ne seront plus consommés.

Délai moyen du traitement : 6 à 8 semaines en fonction de l'infestation.

Rats et souris : disposer 1 à 3 sachets de 15g d'appât par poste.

Pour une infestation moyenne : espacer les postes de 15 mètres.

Pour une infestation moyenne : espacer les postes de 3 mètres.

Les distances sont mentionnées à titre indicatif et sont fonction du degré de l'infestation et du bâtiment



Produit biocide : TP14

AMM :2010593

Contient

0.005% Brodifacoum

Type :

RB (prêt à l'emploi) Pâte aromatisée. Contient un agent amérissant.

Durée de conservation :

2 ans

Conditionnements

Seau de 15kg

ZA de Kerampaou


29140 MELGVEN

Tel. 02 98 59 57 57

Fax. 02.98 59 55 47

larc@wanadoo.fr

BR00011



BRODITOP



PRECAUTIONS

Le port des gants en latex est recommandé lors de la pose des appâts, de l'élimination des cadavres et des déchets. Se laver les mains après utilisation.



Xn - Nocif

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser les risques pour les espèces non cibles ou pour les enfants. Si possible sécuriser les appâts pour qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs : utiliser des postes sécurisés où l'appât est fixé ou bloqué. Les postes d'appâtage seront clairement identifiés comme contenant des rodenticides et si possible fixés pour éviter tout déplacement.

Suivre les instructions locales en cas de traitement dans une zone publique. Marquer la zone pendant le traitement. Une notice ou une étiquette identifiera le danger et mentionnera l'antidote.

Éliminer les cadavres selon les instructions locales afin d'éviter tout risque pour les prédateurs (intoxication secondaire).

Enlever les appâts non consommés et les postes d'appâtage en fin de traitement.



« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. »

Produit biocide : TP14

AMM :2010593

Contient

0.005% Brodifacoum

Type :

RB (prêt à l'emploi) Pâte aromatisée. Contient un agent amérissant.

Durée de conservation :

2 ans

Conditionnements

Seau de 15kg

ZA de Kerampaou
29140 MELGVEN

Tel. 02 98 59 57 57

Fax. 02.98 59 55 47

larc@wanadoo.fr

BR00011

